Calcolo Numerico
Ingegneria Meccanica (sede di Vicenza)
Esame - 20 settembre 2006

1. Data l'equazione $f(x) = \ln x + x^2 - x = 0$,
 - a) si provi, anche solo graficamente, che l'equazione ammette l'unica radice $\xi = 1$ nell'intervallo $[0.7, 2.3]$;
 - b) si applichino due iterazioni del metodo dicotomico (o delle bisezioni) a partire dall'intervallo dato, chiamando con x_0 l'ultimo valore ottenuto con tale metodo;
 - c) a partire da x_0 del punto b) si calcoli l'approssimazione x_1 con il metodo di Newton-Raphson;
 - d) a partire da x_0 e x_1 del punto c) si calcolino le approssimazioni x_2 e x_3 con il metodo della Regula Falsi;
 - e) considerata la radice esatta $\xi = 1$, si calcoli la costante asintotica di convergenza del metodo della Regula Falsi.

2. Sia dato il sistema lineare $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, dove

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 7 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 30 \\ 34 \\ 7 \end{pmatrix}$$

- a) Provare che gli schemi di Jacobi e di Seidel convergono e calcolare la velocità asintotica di convergenza di entrambi gli schemi.
 - b) A partire dallo stesso vettore iniziale $\mathbf{x}_0 = (0 \ 0 \ 0)^T$, calcolare le approssimazioni $\mathbf{x}_1$ e $\mathbf{x}_2$ che si ottengono applicando lo schema di Jacobi e lo schema di Seidel.

3. Sia dato l'integrale $I = \int_{-2}^0 e^{-x}(x+1) dx$.
 - a) Approssimare il valore dell'integrale applicando la formula dei trapezi con $n = 5$ suddivisioni in parti uguali dell'intervallo di integrazione.
 - b) Trovare una maggiorazione dell'errore commesso e, dopo aver calcolato analiticamente l'integrale esatto, confrontare tale stima con l'errore esatto.

4. Interpolazione di Lagrange. Formula del resto.

Tempo a disposizione: 2 ore e 15 minuti

1. È data l'equazione $f(x) = \ln x + x^2 - x = 0$

a) Da $f(x) = 0$ si ricava $\ln x = x - x^2$, per cui graficamente si ha

Le due curve si intersecano in un solo punto, che vale $\xi = 1$.

Analiticamente, invece, la funzione $f(x)$ assume valori di segno opposto agli estremi dell'intervallo dato:

$$f(0.7) = -0.566674943938732$$

$$f(2.3) = 3.8229091229351$$

Inoltre f è continua, quindi ammette almeno una radice nell'intervallo dato. La derivata prima è: $f'(x) = \frac{1}{x} + 2x - 1$, che possiamo anche scrivere come $f'(x) = \frac{1 + 2x^2 - x}{x}$: numeratore e denominatore sono entrambi sempre positivi nell'intervallo dato, (l'equazione $2x^2 - x + 1 = 0$ ha radici nel campo complesso $x_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{1-8}}{4} = \frac{1 \pm \sqrt{-7}}{4}$ e quindi l'equazione è sempre positiva). Di conseguenza $f'(x)$ è una funzione positiva, f è crescente e ammette un'unica radice.

b) Applichiamo il metodo delle bisezioni a partire dall'intervallo dato (utilizziamo la notazione x_s per indicare l'estremo sinistro dell'intervallo, x_d per indicare l'estremo destro dell'intervallo, x_c , il punto medio dell'intervallo considerato):

iter.	x_s	$f(x_s)$	segno	x_d	$f(x_d)$	segno	x_c	$f(x_c)$
1	0.7	-0.566674944	-	2.3	3.822909123	+	1.5	1.155465108
2	0.7	-0.566674944	-	1.5	1.155465108	+	1.1	0.205310180

Il valore x_0 è dunque $x_0 = 1.1$.

c) Il metodo di Newton-Rapshon è $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ dove $f' = 1/x + 2x - 1$.

Partendo da $x_0 = 1.1$, si ricava $x_1 = 1.1 - \frac{0.20531018}{2.1090909} = 1.002654656$

d) Il metodo della Regula Falsi è $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{C_k}$, con $C_k = \frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$.

Si ha:

k	x_k	$f(x_k)$	C_k
1	1.002654656	0.5312842078E-02	0.2054513650E+01
2	1.000068720	0.1374413812E-03	0.2001364094E+01
3	1.000000046		

e) Considerato che la radice esatta è $\xi = 1$, la costante asintotica di convergenza della Regula Falsi si calcola utilizzando l'espressione $M = \left| \frac{f''(\xi)}{2f'(\xi)} \right|^{0.618}$.

Da $f'(x) = \frac{1}{x} + 2x - 1$ segue $f'(1) = 2$ e $f''(x) = -\frac{1}{x^2} + 2$, da cui $f''(1) = 1$,

per cui $M = \frac{1}{4}^{0.618} = 0.4245481$.

2. È dato il sistema $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, con

$$A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 6 \\ 7 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 30 \\ 34 \\ 7 \end{pmatrix}$$

a) La matrice A non è diagonalmente dominante per righe in quanto, sulla seconda riga, non vale la relazione $5 > 7$. Alla stessa maniera, non è diagonalmente dominante per colonne in quanto, sulla terza colonna, non vale la relazione $5 > 6$. Quindi non possiamo usare il criterio di matrice diagonalmente dominante per provare la convergenza dei due metodi.

Tuttavia, la matrice A è biciclica e coerentemente ordinata, in quanto si può scomporre come

$$\begin{array}{c|cc} 8 & 2 & 6 \\ \hline 7 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \end{array}$$

Quindi se proviamo che lo schema di Jacobi converge, cioè che l'autovalore dominante della matrice di Jacobi è in modulo minore di 1, allora, poichè per matrici bicicliche e coerentemente ordinate vale $\mu^2 = \lambda$, dove λ è l'autovalore dominante della matrice di Seidel, allora anche il metodo di Seidel convergerà alla soluzione.

Infatti da $\mu < 1$ segue $\mu^2 < 1$, quindi l'asserto è provato.

Dobbiamo perciò verificare che la matrice di Jacobi ha autovalori in modulo minori di 1.

La matrice di Jacobi è $E_J = I - D^{-1}A$, cioè

$$E_J = \begin{pmatrix} 0 & -2/8 & -6/8 \\ -7/5 & 0 & 0 \\ -1/5 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1/4 & -3/4 \\ -7/5 & 0 & 0 \\ -1/5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Dobbiamo porre uguale a zero $\det(E_J - \mu I)$.

$$\begin{vmatrix} -\mu & -1/4 & -3/4 \\ -7/5 & -\mu & 0 \\ -1/5 & 0 & -\mu \end{vmatrix} = -\mu^3 + \frac{31}{45}\mu + \frac{17}{45}\mu = 0$$

Si ha: $0 = \det(E_J - \mu I) = -\mu^3 + (\frac{3}{20} + \frac{7}{20})\mu$,

Una radice è dunque $\mu = 0$, e le altre due radici sono $\mu = \pm\sqrt{1/2} = \pm\sqrt{0.5} = 0.707106781$.

Gli autovalori sono tutti reali e quello dominante è $\mu = 0.707106781 < 1$. C'è, dunque, convergenza per il metodo di Jacobi.

Poichè per Seidel vale $\lambda = \mu^2 = 0.5$, si ha convergenza anche per Seidel.

Le velocità di convergenza valgono

$$R_J = -\log_{10}(\mu) = 0.1505149$$

$$R_S = -\log_{10}(\lambda) = 0.301029995 = -\log_{10}(\mu^2) = 2R_J$$

b) Lo schema di Jacobi è:

$$\begin{cases} x_{k+1}^1 = \frac{1}{8}(30 - 2x_k^2 - 6x_k^3) \\ x_{k+1}^2 = \frac{1}{5}(34 - 7x_k^1) \\ x_{k+1}^3 = \frac{1}{5}(7 - x_k^1) \end{cases}$$

Partendo dal vettore $\mathbf{x}_0$ con componenti tutte nulle, abbiamo

k	x_k^1	x_k^2	x_k^3
0	0	0	0
1	3.75	6.8	1.4
2	1.0	1.55	0.65

(Per curiosità, per arrivare a convergenza con una tolleranza pari a 10^{-9} occorrono 68 iterazioni.)

Lo schema di Seidel è:

$$\begin{cases} x_{k+1}^1 = \frac{1}{8}(30 - 2x_k^2 - 6x_k^3) \\ x_{k+1}^2 = \frac{1}{5}(34 - 7x_{k+1}^1) \\ x_{k+1}^3 = \frac{1}{5}(7 - x_{k+1}^1) \end{cases}$$

Partendo dal vettore $\mathbf{x}_0$ con componenti tutte nulle, abbiamo

k	x_k^1	x_k^2	x_k^3
0	0	0	0
1	3.75	1.55	0.65
2	2.875	2.775	0.825

(con la stessa tolleranza 10^{-9} , occorrono 33 iterazioni perchè Seidel arrivi a convergenza). La soluzione esatta è il vettore $\mathbf{x} = (2 \ 4 \ 1)^T$.

3. Dobbiamo risolvere l'integrale $I = \int_{-2}^0 e^{-x}(x+1) dx$.

a) Applichiamo la formula dei trapezi con $n = 5$ suddivisioni dell'intervallo dato. Vale, dunque, $h = 0.4$. I punti da considerare e il valore della $f(x) = e^{-x}(x+1)$, sono:

i	x_i	$f(x_i)$
0	-2	-7.3890561
1	-1.6	-2.97181945
2	-1.2	-0.664023385
3	-0.8	0.445108186
4	-0.4	0.895094819
5	0	1

La formula dei trapezi è

$$I_{trap} = h \left(\frac{f(x_0) + f(x_5)}{2} + f(x_1) + f(x_2) + f(x_3) + f(x_4) \right) = -2.19606715$$

b) Per calcolare una maggiorazione dell'errore commesso, dobbiamo calcolare la derivata seconda della f .

Da $f(x) = e^{-x}(x+1)$ segue $f'(x) = -e^{-x}(x+1) + e^{-x} = -e^{-x}x$ e $f''(x) = e^{-x}x - e^{-x} = e^{-x}(x-1)$.

La $f''(x)$ è di segno negativo e crescente, con $f''(-2) = -22.1671682968$ e $f''(0) = -1$. A noi interessa il massimo in valore assoluto della f'' , quindi $M = \max |f''(x)| = |f''(-2)|$.

$$\text{Si ha: } |E_{trap}| \leq M \frac{|(b-a)^3|}{12 \cdot 5^2} = 0.591124488$$

Analiticamente, è facile calcolare l'integrale esatto (per parti):

$$I = \int_{-2}^0 f(x) \, dx = -e^{-x}(x+1)|_{-2}^0 + \int_{-2}^0 e^{-x} \, dx$$

$$I = \int_{-2}^0 f(x) \, dx = -e^{-x}(x+2)|_{-2}^0 = e^{-2}(0) - e^0(2) = -2$$

Quindi l'errore esatto è: $|I - I_{trap}| = 0.196067154$, un valore minore della maggiorazione trovata prima.